

# Signes cliniques de la maladie d'Alzheimer



## Quels sont les troubles ?

**La perte de mémoire est le signe spécifique de la maladie d'Alzheimer :**

- 75 % des cas débutent par une atteinte mnésique
- L'atteinte porte d'abord sur la mémoire des faits récents : *altération de la capacité à apprendre des informations nouvelles ou à se rappeler les informations apprises antérieurement*
- Puis sur d'autres fonctions supérieures et sur la mémoire ancienne

## Les autres troubles intellectuels

- Déficit du langage (aphasie) : *perte du mot, de la syntaxe, de la lecture et de l'écriture*
- Atteinte de la gestuelle (apraxie) : *difficultés à réaliser des actions complexes puis des actes élémentaires de la vie courante*
- Atteinte des capacités de reconnaissance (agnosie) : *difficultés dans l'identification de personnes, de lieux ou d'objets puis de soi*
- Troubles visuo-spatiaux : *de l'orientation, de la reconnaissance et de la reproduction image*
- Déficit des fonctions exécutives : *difficultés pour faire des projets, s'organiser dans le temps, avoir une pensée abstraite (calcul, jugement, raisonnement)*
  
- Perturbations affectives : anxiété, dépression, perturbations émotionnelles (*incontinence émotionnelle/apathie*)
- Troubles psychotiques : Délires, hallucinations, troubles de l'identification
- Troubles du comportement : Agitation +/- Agressivité, Conduites stéréotypées, déambulation
- Troubles des conduites élémentaires : Sommeil, alimentation, sexualité

## Comment fait-on le diagnostic ?

- Des signes cliniques évocateurs
- Des tests neuropsychologiques
- Un bilan pour écarter d'autres maladies et aider à affirmer le diagnostic : *prise de sang (pour éliminer d'autres maladies), IRM ou scanner cérébral, Scintigraphie cérébrale*

